

## VACINA CONTRA VARICELA

É uma vacina contra o vírus varicela-zoster, o agente causal da varicela e do herpes-zoster.

O **esquema vacinal** é diferente consoante a vacina administrada:

### 1º opção -

A partir das 12 meses - 2 doses com intervalo de 6 semanas

### 2º opção -

A partir dos 12 meses até aos 12 anos - 2 dose com intervalo de pelo menos 4 semanas

A partir dos 13 anos - 2 doses com intervalo de 4 a 8 semanas.

*Para vacinação  
contacte o seu  
médico e  
enfermeiro de  
família.*




### **Elementos:**

B. Neto, L. Mota, M. Crispim, S. Nogueira. (2022). ESEnfC

### **Fontes:**

- Sociedade Portuguesa Pediatria
- Sociedade de Infeciologia Pediátrica
- Programa Nacional de Vacinação
- Norma DGS 007/2021

# VACINAS EXTRA PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO



Vacinas contra  
*Neisseria  
meningitidis*  
ACWY

Vacinas contra  
Rotavírus

Vacina contra  
Varicela



## VACINA CONTRA MENINGITIDIS ACWY

A vacina contra a *N. meningitidis* A, C, W, Y previne o aparecimento da doença invasiva meningocócica.

Sendo que o **esquema vacinal até os 2 anos de idade** possível é:

### 1º opção -

A partir das 6 semanas até aos 6 meses - 2 doses + dose de reforço (12 meses)

### 2º opção -

A partir dos 6 meses até aos 12 meses - 1 dose + reforço (12 meses)

O **esquema vacinal a partir dos 2 anos** consiste em uma dose apenas.



### Recomendações para vacinar contra *N. meningitidis* ACWY:

- A viajantes com estadias prolongadas na Africa, Brasil, nos países do Norte da Europa.

### Exceções das vacinas contra o Rotavírus:

A vacina é gratuita para crianças que apresentem algumas patologias, referidas na Norma DGS 007/2021,. Porém, é necessário uma prescrição médica.



## VACINA CONTRA ROTAVÍRUS

É uma vacina contra a **Rotavírus**, o vírus que causa de forma mais frequente diarreia aguda e desidratação entre os 6 e os 24 meses de idade.

O **esquema vacinal** da vacina que abrange os tipos: G1P(8), G2P(8), G3P(8) e G4P(8):

- 3 doses com intervalos de 4 semanas (1º dose entre as 6 e as 12 semanas de idade)

O **esquema vacinal** da vacina que abrange o tipo G1P(8):

- 2 doses com intervalos de 4 semanas (1º dose entre as 6 e as 16 semanas de idade)

