

أولاً: أسئلة الصواب أو الخطأ:

- س1) يزداد نشاط الفلزات القلوية، كلما قل الحجم الذري للفلز
(أ) صح (ب) خطأ
- س2) يضاف القصدير الي النحاس في سبيكة البرونز.
(أ) صح (ب) خطأ
- س3) تتحل نترات الفلزات المستقرة الموجودة باعلي السلسلة فقط الي اكسيد فلز مع تصاعد غاز الاكسجين
(أ) صح (ب) خطأ
- س4) الكيمياء العضوية تتعلق بمركبات الكربون.
(أ) صح (ب) خطأ
- س5) الكحولات سؤائل تساهمية متعادلة ولا الكتروليتية .
(أ) صح (ب) خطأ
- س6) يتفاعل الايتانول مع حمض الايتانويك لتكوين ايثانوات الميثيل وماء.
(أ) صح (ب) خطأ
- س7) تحدث ظاهرة التشكل عند اختلاف المركبات ذات نفس الصيغة الجزيئية في الصيغة البنائية.
(أ) صح (ب) خطأ

ثانيا أسئلة الاختيار من متعدد

- س8) ليس من الممكن وجود احد المستويات الفرعية الاتية في درة ما:
(أ) 3d (ب) 1p (ج) 3p (د) 2s
- س9) ذرات العناصر غلافها الخارجي مكتمل بالإلكترونات:
(أ) فلزات الاقلاء (ب) فلزات الإقلاء الارضية (ج) فلزات الانتقالية (د) فلزات النبيلة
- س10) لونه بني محمر سريع التطاير :
(أ) اليود (ب) الكلور (ج) الفلور (د) البروم
- س11) تستخدم سبيكة في حشوة الاسنان :
(أ) امالجام (ب) نحاسونيكيل (ج) بيوتر (د) ماجناليوم
- س12) عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع الخارصين يتصاعد غاز
(أ) النيتروجين (ب) الاكسجين (ج) ثاني اكسيد الكبريت (د) الهيدروجين
- س13) عند اضافة ماء البروم الي غاز الايتين يعرف الناتج باسم
(أ) كلورو ايثان (ب) كلورو فورم (ج) 1، 2- ثنائي برومو ايثان

أنتهت الاسئلة