

1. בהפרעת תסמינים סומטיים אנשים
 - א. מתחלים במודע (כלומר עושים עצמם כאילו הם חולים
 - ב. בעלי פחד עז וחרדה מוגזמת ממחלה כאשר אין תסמינים כלל
 - ג. בעלי פחד עז וחרדה מוגזמת ממחלה כאשר ישנם תסמינים אך קלים ואינם מצדיקים את החרדה
 - ד. לאנשים הייתה מחלה חמורה וכעת הם חרדים שהיא תחזור
2. כדי שאדם יאובחן סהפרעת תסמינים סומטיים
 - א. צריך שיהיה לו לפחות שלושה תסמינים הגורמים למצוקה
 - ב. צריך שיהיה לו לפחות תסמין אחד הגורם למצוקה
 - ג. אין צורך כלל בתסמין, מספיק שיש לו חשש שמא יבוא אחד כזה
 - ה. צריך שיהיה לו לפחות תסמין אחד שמהווה תסמין של מחלה חמורה
3. טיפול יעיל בהפרעת תסמינים סומטיים
 - א. טיפול התנהגותי
 - ב. טיפול פסיכודינמי
 - ג. טיפול קוגניטיבי
 - ד. טיפול קוגניטיבי התנהגותי
4. מה יכול להוות מניעת תגובה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי?
 - א. לקחת תרופות שיפחיתו את התסמינים הגופניים
 - ב. להימנע מללכת לרופא כל אימת שחש את התסמינים
 - ג. להימנע ממשבחות פולשניות המטרידות בעקבות התסמינים
 - ד. ב וג נכונות
5. ההבדל בין הפרעת חרדה ממחלות להפרעת תסמינים סומטיים הוא שבניגוד להפרעה סומטית להפרעת חרדה
 - א. יש תסמינים גופניים מובהקים
 - ב. יש תסמינים גופניים שאינם מובהקים
 - ג. אין תסמינים גופניים, ואם יש הם קלים בלבד
 - ד. זו אותה ההפרעה רק בשני מונחים
6. תסמיני המרה הם תסמינים
 - א. שאדם בודה מליבו כדי לקבל תשומת לב
 - ב. שניתן להסבירם על ידי רופא ובדיקות רפואיות
 - ג. שלא ניתן להסבירם על ידי רופא ובדיקות רפואיות
 - ד. שאינם חמורים כל כך אך האדם חושש מהם באופן מוגזם
7. אדם הסובל מתסמינים של עיוורון או חירשות
 - א. ייתכן שיפנה את ראשו למקום בו מישהו אמר את שמו כשלוקה בתסמין חירשות
 - ב. ייתכן שיוכל לנווט את דרכו על אף שסובל מתסמיני עיוורון
 - ג. אדם הסובל מתסמיני עיוורון לא יוכל לנווט את דרכו אך אדם הסובל מתסמיני חרשות ייתכן שיפנה את ראשו ל"משמע" שמו
 - ד. א וב נכונות
8. טווח התסמינים של הפרעת המרה מתמקד בהפרעות גופניות:
 - א. מוטוריות
 - ב. חישתיות
 - ג. התקפי פרכוסים
 - ד. כל השלושה
9. בהתקפי פרכוסים של תסמיני המרה האדם שחווה התקף
 - א. נצפה אצלו פעולה מוחית זרה ברישום גלי מוח לאדם הסובל מאפילפסיה
 - ב. יהיה מבולבל לאחר ההתקף
 - ג. יאבד את זיכרונו לאחר ההתקף

- ד. אף תשובה אינה נכונה
10. ככל שהבדיקות הרפואיות נעשו מתוחכמות יותר עם השנים כך
- עלתה שכיחותה של הפרעת המרה
 - ירדה שכיחותה של הפרעת המרה
 - לא חל שינוי בתפוצתה של המחלה
 - זו שאלה שהחוקרים מתעסקים בה רבות אך לא הגיעו לממצאים חותכים
11. הפרעת המרה שכיחה יותר אצל
- נשים
 - גברים
 - נשים וגברים במידה שווה
 - בגילאי התיכון שכיחה יותר אצל נשים אך עם השנים השכיחות נעשית שווה לשני המינים
12. במחקרי הדמיה מוחית, כאשר אנשים בעלי שיתוק המרה ברגלם נתבקשו להזיז את הרגל
- נמצא פעילות באזור המוטורי כמו אצל אנשים בריאים או באיבר אחר
 - נמצא פעילות באזור המוטורי אך חלש יותר מאשר אצל אנשים בריאים או באיבר אחר ללא שיתוק
 - לא נראתה פעילות באזורים המוטורים אך נמצאה פעילות באזורים המעורבים בפעילות רגשית
 - לא נראתה פעילות באזורים המעורבים בפעילות רגשית אך נמצאה פעילות באזורים מוטוריים
13. בהשפעת היפנוזה או כאשר מעירים אדם מדינה עמוקה:
- האדם מסוגל לעתים להזיז את האיבר המשותק
 - האדם לא מסוגל להזיז את האיבר המשותק
 - בהשפעת היפנוזה ניתן לבטל את התסמינים אך לא כשמעירים אדם משינה
 - כשמעירים אדם משינה הוא מסוגל להזיז את האיבר המשותק אך לא בהשפעת היפנוזה
14. בהפרעה בדויה האדם
- בודה מחלה ללא תסמינים גופניים
 - בודה מחלה אך יש לו תסמינים גופניים
 - האדם מקבל תגמולים חיצוניים מוחשיים
 - ב וג נכונות
15. מה ההבדל בין הפרעת בדויה להפרעת התחלות
- בהפרעת בדויה האדם מקבל תגמול כאשר הוא נתפס כחולה
 - בהפרעת התחלות האדם ממקבל תגמול כאשר נתפס כחולה
 - אין הבדל בשתי ההפרעות האדם מקבל גמול כאשר הוא נתפס כחולה
 - אין הבדל בשתי ההפרעות האדם אינו מקבל תגמול כאשר הוא נתפס כחולה
16. בהפרעת בדויה האדם בודה מחלה גופנית אך לא פסיכולוגית (נכון/לא נכון)
17. ההבדל בין הפרעת המרה להפרעות בדויה והתחלות
- הפרעת המרה מתייחסת לתסמינים פסיכולוגיים
 - הפרעות בדויה והתחלות מתייחסות לתסמינים פסיכולוגיים
 - בהפרעת המרה האדם בודה את המחלה ואילו הפרעות האחרות האדם חש באמת את התסמינים
 - בהפרעות בדויה והתחלות האדם בודה את המחלה ואילו בהפרעת המרה האדם חש באמת את התסמינים
18. תסמונת מינכהאוזן היא:
- הפרעת בדויה הנכפית על הזולת
 - הפרעה בה האדם מעמיד כאילו מישהו אחר חולה
 - הפרעה בה אדם עלול לפגוע בזולת כדי שייראה חולה
 - כל התשובות נכונות
19. אובדן תחושת המציאות וניתוק מן הן העצמי מופיעים כתסמינים
- בהפרעת ניתוק בלבד

- ב. בהפרעת ניתוק ובהפרעת חרדה
 ג. בהפרעת חרדה ובעקה פוסט טראומטית
 ד. בהפרעת ניתוק ובהפרעת פאניקה
20. באובדן תחושת המציאות ובניתוק מן העצמי בוחן המציאות
- א. נפגע
 ב. אינו נפגע
 ג. באובדן תחושת המציאות הוא נפגע ובניתוק מן העצמי אינו נפגע
 ד. בניתוק מן העצמי הוא הוא נפגע ובאובדן תחושת המציאות אינו נפגע
21. בשיכחון ניתוקי סוג הזיכרון שנפגע הוא
- א. זיכרון אפיזודי
 ב. זיכרון אוטוביוגרפי
 ג. זיכרון סמנטי
 ד. א וב נכונות
22. במצב של שיכחון ניתוקי הזיכרון החבוי והזיכרון הסמנטי
- א. נפגעים
 ב. נשארים תקינים
 ג. סמנטי נפגע והחבוי נשאר תקין
 ד. החבוי נפגע והסמנטי נשאר תקין
23. בהפרעת זהות מנותקת ההבדל בין האישיות השונה מתבטא בהיבטים
- א. פסיכולוגיים כגון מאפיינים אישיותיים
 ב. ביולוגיים ופיזיים כגון יד דומיננטית, יכולת ראייה
 ג. גם פסיכולוגיים גם פיזיים
 ד. האישיות המארחת היא אישיות שלא נושאת את השם האמיתי בעוד שאישיות אחרת נושאת את השם האמיתי של האדם
24. הפרעת זהות מנותקת שכיחה יותר אצל
- א. גברים
 ב. נשים
 ג. שווה לשני המינים
 ד. נשים אך לגברים ישנן יותר מצבי אישיות שונים
25. כאשר אדם נמצא במצב אישיות א
- א. הוא אינו זוכר פרטים על מצב אישיות ב
 ב. הוא זוכר פרטים על מצב אישיות ב
 ג. לעיתים זוכר ולעיתים אינו זוכר
 ד. רק הזהות המארחת זוכרת פרטים על מצבי האישיות השונים
26. כאשר הפרעה היא חלק נורמלית של התנהלות דתית מקובלת
- א. עדיין נוכל להגדיר אותה כהפרעת זהות מנותקת
 ב. לא נוכל להגדיר אותה כהפרעת זהות מנותקת
 ג. אם האדם חווה בנוסף הפרעה פוסט טראומטית נוכל להגדירה כהפרעת זהות מנותקת
 ד. אם האדם אינו חווה בנוסף הפרעה פוסט טראומטית נוכל להגדירה כהפרעת זהות מנותקת
27. המחלוקת הגדולה על הסיבות להפרעת זהות מנותקת מביאה שתי גישות להסבירה:
- א. הפרעה שנולדה בעקבות טראומה
 ב. הפרעה התנהגותית בה האדם גילה שמישהו אחר מקבל יותר תשומת לב ואימץ את אופיו
 ג. התיאוריה החברתית קוגניטיבית בה בעידוד המטפל האדם אימץ זהות אחרת
 ד. א וג נכונות

28. ה נכון לגבי הפרעת זהות מנותקת ולהפרעה פוסט טראומטית
- א. בשתיהן יש תסמיני ניתוק
 - ב. בשתיהן יש תסמיני חרדה
 - ג. בהפרעת זהות מנותקת יש תסמיני ניתוק אך לא סימני חרדה ובהפרעה פוסט טראומטית יש סימני חרדה אך לא סימני ניתוק
 - ד. א וב נכונות
29. משנות ה-80 של המאה הקודמת שכיחותה של הפרעת זהות מנותקת
- א. עלה משמעותית
 - ב. ירד משמעותית
 - ג. עלה אך באופן לא דרמטי
 - ד. לא נצפה הבדל לאורך השנים
30. תרופות נוגדות דיכאון ונוגדות חרדה שניתנו לאנשים עם הפרעת זהות מנותקת:
- א. סייעו באופן מובהק להפחתת התסמינים
 - ב. לא סייעו כלל בהפחתת התסמינים
 - ג. הרעו וגרמו להגברת התסמינים
 - ד. סייעו להפחתת התסמינים אך באופן קל בלבד
31. גרייה מגנטית חוצה גולגולת התגלה כטיפול יעיל בהפרעת ניתוק מן העצמי (נכון/ לא נכון)