

שאלות חזרה פרק 13

1. אבא מבוגר בעת הלידה מעלה את הסיכון להתפתחות סכיזופרניה אצל התינוק (נכון/ לא נכון)
2. רוב מקרי הסכיזופרניה מופיעים  
א. בגילאי הילדות  
ב. בתחילת גיל ההתבגרות  
ג. בסוף גיל ההתבגרות  
ד. בגיל הבגרות הצעירה (+20)
3. במהלך החיים הסיכוי להיארעות של סכיזופרניה (התפרצות המחלה)  
א. יורד הן אצל גברים והן אצל נשים  
ב. עולה הן אצל גברים והן אצל נשים  
ג. לגברים יורד באופן עקבי ואצל נשים יש מידי פעם עלייה בסיכוי להתפרצות המחלה  
ד. אצל נשים יורד באופן עקבי ואצל גברים יש מידי פעם עלייה בסיכוי להתפרצות המחלה
4. הזיה היא חוויה חושית שנדמית כאמיתית אך ללא גירוי תפיסתי, השכיחה ביותר היא הזיה  
א. שמיעתית  
ב. ראייתית  
ג. ריח  
ד. מישוש
5. אדם חרש הלוקה בסכיזופרניה לא יחווה הזיה באמצעות קולות (נכון/ לא נכון)
6. מה מבין הבאים אינו מהווה תסמין לסכיזופרניה  
א. דיבור לא מאורגן  
ב. הזיות  
ג. הרהורי שווא  
ד. כל התסמינים מהווים תסמינים לסכיזופרניה
7. הלוקה בסכיזופרניה הנשאר זמן ממושך בתנחות גוף בלתי רגילה ללא אי נוחות זה מצב:  
א. דלזיה  
ב. אשלייתי  
ג. קטטוני  
ד. חיובי
8. הרהורי שווא או הזיות נקראים תסמינים  
א. חיוביים  
ב. שליליים  
ג. הזיות - חיובי והרהורי שווא - שלילי  
ד. הרהורי שווא - חיובי והזיות - שלילי
9. תסמינים שליליים כגון חוסר בהבעת רגשות מראים כי  
א. לסכיזופרניים יש קושי לחוות רגשות ולכן גם להביע אותן  
ב. לסכיזופרניים יש קושי להביע רגשות אך לא קושי לחוות אותם  
ג. סכיזופרניים חווים יותר רגשות מאנשים רגילים ולכן לא מצליחים להביע אותם  
ד. ב וג נכונות
10. בהפרעה סכיזואפקטיבית  
א. האדם חווה אפיזודות של מצב רוח קשה  
ב. האדם חווה תסמיני סכיזופרניה ללא אפיזודות של מצב רוח קשה  
ג. האדם חווה גם אפיזודות של מצב רוח וגם תסמיני סכיזופרניה  
ד. האדם חווה תסמיני הרהורי שווא בעקבות חומרים שלקח
11. בהפרעה דמוית סכיזופרניה יש תסמיני סכיזופרניה הנמשכים  
א. בין חצי שנה לשנה  
ב. בין חודש אחד לחצי שנה  
ג. שבועיים לפחות  
ד. במשך יומיים בכל חודש

12. מה מבדיל בין הפרעת הרהורי שווא לסכיזופרניה?  
 א. בסכיזופרניה אין הרהורי שווא שלא כמו בהפרעת הרהורי שווא  
 ב. בהפרעת הרהורי שווא ההתנהגות באופן כללי נורמלי שלא כמו בסכיזופרניה  
 ג. בהפרעת הרהורי שווא יש סגירות חברתית משמעותית שלא כמו בסכיזופרניה  
 ד. אף תשובה אינה נכונה
13. בהפרעה פסיכוטית קצרה נראים  
 א. הרהורי שווא או הזיות  
 ב. דיבור לא קוהרנטי  
 ג. התנהגות קטטונית  
 ד. כל התשובות נכונות
14. הפרעה פסיכוטית קצרה לא תקבל אבחון כאשר ההתקף הפסיכוטי קרה פעם אחת בחייו של אדם (נכון/ לא נכון)
15. ילדים בעלי סיכון גנטי גבוה לסכיזופרניה הגדלים במשפחות מאמצות:  
 א. נתונים בסיכון גבוה ביותר כאשר המשפחה המאמצת היא בעלת חריגה בתקשורת  
 ב. נתונים בסיכון גבוה ללא קשר לחריגה/ אי חריגה בתקשורת של המשפחה המאמצת  
 ג. נתונים בסיכון נמוך לפתח סכיזופרניה כאשר המשפחה המאמצת היא בעלת חריגה נמוכה בתקשורת  
 ד. א ו ג נכונות
16. מהשאלה הקודמת ניתן להסיק  
 א. אין משמעות לגנטיקה אלא רק לסביבה ההתפתחותית, בהתפתחות סכיזופרניה  
 ב. יש משמעות לגנטיקה אך לא לסביבה ההתפתחותית, בהתפתחות סכיזופרניה  
 ג. יש משמעות לסביבה ההתפתחותית בהתפתחות סכיזופרניה  
 ד. יש משמעות לגנטיקה בהתפתחות סכיזופרניה
17. דלקת נגיפית אצל האם מגבירה את הסיכוי לסכיזופרניה אצל העובר כאשר  
 א. האם חלתה בשליש האחרון להיריון  
 ב. אין קשר בין שפעת האם להתפתחות סכיזופרניה  
 ג. בחצי הראשון של ההיריון האם חלתה בשפעת ובמיוחד בשליש הראשון  
 ד. בכל שלב בהיריון, אם האם חלתה, סיכון העובר לפתח סכיזופרניה גדול באותה עוצמה
18. כאשר סוג הדם של האם והתינוק שונים  
 א. יש לתינוק סיכון מופחת לסכיזופרניה  
 ב. יש לתינוק סיכון מוגבר כמעט פי 2 לסכיזופרניה  
 ג. אין קשר בין סוג הדם של האם והתינוק לסיכון לסכיזופרניה  
 ד. יש סיכון מוגבר רק כאשר הסוג הוא שלילי הן אצל האם והן אצל העובר
19. מה מהבאים אינו מהווה סיכון לפתח סכיזופרניה  
 א. חסך תזונתי של האם בהיריון  
 ב. עקה של האם בהיריון  
 ג. דלקת נגיפית אצל האם בהיריון  
 ד. כל התשובות יכולות להוות גורם לסכיזופרניה
20. למי מהבאים יש סיכוי רב יותר לפתח סכיזופרניה יחד?  
 א. לתאומים זהים החולקים שליה אחת  
 ב. לתאומים זהים החולקים שתי שליות  
 ג. לתאומים לא זהים החולקים שליה אחת  
 ד. לתאומים לא זהים החולקים שתי שליות
21. מה ניתן להסיק מהשאלה הקודמת  
 א. גנים וסביבה משפיעים במידה שווה על התפתחות סכיזופרניה  
 ב. גנים משפיעים יותר על הסיכוי לסכיזופרניה  
 ג. סביבה משפיעה יותר מגנים על התפתחות לסכיזופרניה  
 ד. לסביבה יש השפעה רבה בהתפתחות לסכיזופרניה

22. ילדים" קדם סכיזופרניים" מראים

- א. חריגות מוטוריות יותר מילדים רגילים  
 ב. פחות הבעות רגש חיוביות מילדים רגילים  
 ג. יותר הבעות רגש חיובי מילדים רגילים  
 ד. א וב נכונות
23. אצל אנשים עם סכיזופרניה נראה ליקוי לעיתים בקוגניציה חברתית (נכון/ לא נכון)
24. חדרי המוח אצל הלוקים בסכיזופרניה הם  
 א. גדולים יותר  
 ב. קטנים יותר  
 ג. שווים לאנשים נורמליים  
 ד. גדולים יותר אך ככל שהמחלה ממשיכה הם הולכים וקטנים
25. האם יש קשר בין פגיעת ראש להתפתחות סכיזופרניה?  
 א. ילדים עד גיל 5 שנפגעו בראשם, יש להם סיכון רב לפתח סכיזופרניה כעבור 10 שנים  
 ב. ילדים בין גיל 11 ל-15 שחוו פגיעת ראש, הם בעלי סיכון גבוה לפתח סכיזופרניה בגיל ההתבגרות  
 ג. אין קשר בין פגיעות ראש להתפתחות סכיזופרניה.  
 ד. אנשים בגילאי 30-40 שחוו אירוע מוחי, הם בעלי סיכון מוגבר לפתח סכיזופרניה
26. אצל זוג תאומים שאחד לקה בסכיזופרניה, נראה אצל התאום השני (הבריא)  
 א. מבנה מוח רגיל  
 ב. מבנה מוח גדול ביחס לחברה  
 ג. מבנה מוח קטן ביחס לחברה  
 ד. יותר חומר אפור במוח ביחס לחברה
27. איזה נירורטרנסמיטר המעורב בסכיזופרניה (פעילות מוגברת שלו מעלה סימני מחלה)?  
 א. סרוטונין  
 ב. נורפאינפריין  
 ג. גאבא  
 ד. דופמין
28. התרופה L DOPA משמשת לטיפול ב \_\_\_\_\_ אך גורמת ל \_\_\_\_\_ תסמינים פסיכויים  
 א. פרקינסון, להפחתה  
 ב. פרקינסון, להגברה  
 ג. הנטיגטון, הפחתה  
 ד. הנטיגטון, הגברה
29. האם הגירה וחיים בסביבה עירונית יכולים להוות גורם לסכיזופרניה?  
 א. כן שניהם מהווים גורם סיכון  
 ב. לא, אין קשר בין סביבה עירונית והגירה לסיכוי לפתח סכיזופרניה  
 ג. לחיים בסביבה עירונית יש קשר עם סכיזופרניה, אך אין קשר בין הגירה לסכיזופרניה  
 ד. להגירה יש קשר לסכיזופרניה, אך חיים בסביבה עירונית לא מהווים גורם סיכון למחלה
30. מה מהבאים אינו מהווה גורם סיכון לכיזופרניה  
 א. שימוש רב באלכוהול  
 ב. אבא זקן  
 ג. סיבוכים בלידה  
 ד. שימוש בקנאביס
31. האם אנשים הלוקים בסכיזופרניה מועדים למות מוקדם יותר מתוחלת החיים הצפויה?  
 א. כן, המחלה מגדילה את הסיכון למות מוקדם יותר  
 ב. לא, להפך אנשים עם סכיזופרניה, חיים יותר שנים  
 ג. לא, אנשים עם סכיזופרניה חיים בממוצע כמו אנשים בריאים  
 ד. כן, אך רק אצל גברים נראה תמותה בגיל צעיר יותר, אך לא אצל נשים

32. תרופות טיפוסיות מהדור הראשון משפיעות על המוח כך ש

א. חוסמות קולטני גאבא

ב. חוסמות קולטני גלוטמט

ג. מגבירות את כמות הדופמין בסינפסה

ד. חוסמות קולטני דופמין, בעיקר מסוג D2

33. מה נכון לגבי ההבדלים בין גברים לנשים הלוקים בסכיזופרניה?

א. גברים מפתחים את המחלה מוקדם יותר

ב. נשים מפתחות את המחלה מוקדם יותר

ג. לגברים יש תסמינים יותר חמורים מאשר לנשים

ד. א ו ג נכונות

34. להורמון אסטרוגן יש השפעות אנטי פסיכוטיות , ומתן ההורמון לחולים מפחית אך תסמיני

המחלה (נכון/ לא נכון)