

1. מהן הפרעות המופיעות בגיל המוקדם בביותר?
  - א. הפרעות מצב רוח
  - ב. הפרעות חרדה
  - ג. הפרעות התנהגות
  - ד. שימוש מזיק בחומרים
2. עד 1952, שתי הפרעות בקרב ילדים שזכו לסיווג הן
  - א. הפרעה חד קוטבית וחרדה
  - ב. טרדנות כפייתית וחרדה
  - ג. סכיזופרניה ותגובת הסתגלות
  - ד. סכיזופרניה והפרעה דו קוטבית
3. טיפול בחרדה בילדים יכול להתבסס על
  - א. תרופות נוגדות חרדה כמו של מבוגרים
  - ב. טיפול פסיכודינמי
  - ג. טיפול קוגניטיבי התנהגותי
  - ד. א ו ג נכונות
4. הורים הלוקים בדיכאון מהווים גורם סיכון לדיכאון אצל הילד (נכון/ לא נכון)
5. הפרעות התנגדות והתנהגות הן הפרעות
  - א. מוחצנות
  - ב. מופנמות
  - ג. התנגדות- מופנמות, התנהגות מוחצנות
  - ד. התנהגות- מופנמות, התנגדות- מוחצנות
6. בהפרעת התנהגות נראים אצל הילד
  - א. מצב רוח רגזני וכועס
  - ב. תנהגות וכחנית
  - ג. נקמנות
  - ד. הפרה חוזרת ונשנית של כללים
7. מה מהבאים אינו מאפיין הפרעת התנגדות
  - א. זלזול בזכויות הזולת
  - ב. מצב רוח רגזני וכועס
  - ג. התנהגות וכחנית
  - ד. נקמנות
8. טיפול שנמצא יעיל בהפרעת התנהגות אצל ילדים
  - א. תרופתי
  - ב. כירוגי
  - ג. משפחתי
  - ד. פסיכודינמי
9. מה מאפיין הרטבה ראשונית והרטבה משנית?
  - א. בהרטבה ראשונית הילד מעולם לא הגיע לשליטה
  - ב. בהרטבה משנית הילד הגיע לשליטה אך חלה נסיגה
  - ג. א ו ב נכונות
  - ד. בהרטבה משנית הילד לא הגיע מעולם לשליטה ובהרטבה ראשונית הילד הגיע לשליטה אך חלה נסיגה
10. בהפרעת הכתמה הילד
  - א. לא שולט בצרכיו בשינה
  - ב. שולט בהוצאת הצואה אך לא בהוצאת השתן
  - ג. לא שולט בצרכיו בזמן עירות
  - ד. א ו ג נכונות
11. הפרעת הכתמה שכיחה יותר אצל
  - א. ילדים

- ב. ילדות
- ג. בנים ובנות במידה שווה
- ד. אין נתונים חותכים
12. לילדים עם הפרעות קשב יש נטייה לקבל במבחן מנת משכל
- א. ציון זהה לילדים רגילים
- ב. ציון גבוה מילדים רגילים
- ג. ציון נמוך מילדים רגילים
- ד. ציון גבוה בחלק הביצועי אך ציון נמוך במילולי
13. הפרעת קשב והיפראקטיביות שכיחה יותר בקרב בנים מאשר בנות (נכון/ לא נכון)
14. חומרים ממריצים הניתנים לילדים עם הפרעת קשב משפיעים עליהם כך ש
- א. הם מגבירים את הפרעת הקשב
- ב. הם מפחיתים את הפרעת הקשב
- ג. הם מגבירים את הפרעת הקשב אצל ילדים אך לא אצל מבוגרים
- ד. הם מגבירים את הפרעת הקשב אצל מבוגרים אך לא אצל ילדים
15. בגילאי חודשיים עד שישה חודשים
- א. נראים אצל ילדים מיקוד בעיניים הן אצל אוטיסטים והן אצל ילדים בריאים
- ב. נראים אצל ילדים חוסר מיקוד בעיניים הן אצל אוטיסטים והן אצל ילדים רגילים
- ג. אצל אוטיסטים נראית ירידה מלהסתכל לאורך זמן בעיניים, אך לא כך אצל ילדים רגילים
- ד. אצל ילדים נורמליים נראית ירידה מלהסתכל לאורך זמן בעיניים אך לא כך אצל אוטיסטים
16. ילדים על הרצף האוטיסטי נוטים להתעסק עם חפצים יוצאי דופן באופן ש
- א. הם נוטים להתעסק לאורך זמן רב עם החפץ
- ב. הם נוטים להתפרץ אם לקחו להם את החפץ בהתקף זעם אלים
- ג. הם נוטים להתעסק מעט זמן עם החפץ ולא כל כך מגיבים כאשר לוקחים להם אותו
- ד. א וב נכונות
17. יש השפעה גנטית על התפתחות אוטיזם, לילדים עם אח על הרצף יש סיכוי גבוה לפתח גם נטייה כזאת (נכון/ לא נכון)
18. מתי מופיעה לרוב הפרעת טורט אצל מי היא שכיחה יותר?
- א. אצל בנים ומופיעה בגילאי הילדות
- ב. אצל בנות ומופיעה בגילאי הילדות
- ג. אצל בנים ומופיעה בשלהי ההתבגרות
- ד. אצל בנות ומופיעה בשלהי ההתבכ=גרות
19. אילו תרופות יעילות להפרעת טיקים מוטוריים?
- א. תרופות נוגדות דיכאון
- ב. תרופות נוגדות חרדה
- ג. א וב נכונות
- ד. תרופות אנטי פסיכוטיות
20. דיסקליסיה היא הפרעה הקשורה
- א. ליכולת להביע רגשות
- ב. ליכולות הבנה
- ג. ליכולת קריאה וכתובה
- ד. לפיגור שכלי
21. יש קשר בין פיגור שכלי לדיסקליסיה (נכון/ לא נכון)
22. רוב האנשים עם מוגבלות שכלית הם בעלי רמת אינטליגנציה של
- א. 100-85
- ב. 85-70
- ג. 70-55

- ד. מתחת ל-50
23. מימהבאים לא יוכל להגיע לעצמאות כלל בחייו
- א. אנשים עם מוגבלות שכלית קלה
  - ב. אנשים עם מוגבלות שכלית בינונית
  - ג. אנשים עם מוגבלות חמורה ואנשים עם מוגבלות שכלית עמוקה
  - ד. בוג נכונות
24. מה מהבאים מהווה גורם סיכון לפגיעות במוח אצל התינוק
- א. אם השותה אלכוהול בכמויות בזמן היריון
  - ב. דימום בתוך המוח במהלך הלידה
  - ג. חשיפה לקרינה מייננת
  - ד. כל השלושה
25. הסיכון לתסמונת דאון עולה כאשר
- א. גיל האם עולה בעת ההתעברות אך לא גיל האב
  - ב. גיל האב עולה בעת ההתעברות אך לא גילה האם
  - ג. הן גיל האב והן גיל האם עולים בעת ההתעברות
  - ד. אין קשר בין גיל ההורים לסיכוי ללדת תינוק עם תסמונת דאון
- 26.